

<u>Sygdom</u>	<u>Inkubationstid</u>	<u>Smitter fra</u>	<u>Smitter til</u>	<u>Møde i institutionen</u>	<u>Særlige forhold</u>
Bylder	Få dage	Bylden begynder at væske	Såret er tørret ind	Når betændelsesstedet er tørret ind	
Børemeorm	2 – 6 uger	2 uger efter smitte	Behandling iværksat	Ingen begrænsninger	
Bømesår	1 – 3 døgn	Sårene begynder at væske	Sårene er tørret ind og skorperne faldet af	Når sårene er ophelede, dvs. tørre, og skorperne er faldet	Skolebørn må møde hvis sårene ikke er meget udbredte.
Cytomegalovirusinfektion	3 – 12 uger			Ingen begrænsninger	
Fnat	3 – 6 uger	Kort efter smitte tidspunkt	Behandling iværksat	Når behandling er iværksat	
Forkølelse og virushalsbetændelse	1 – 7 dage	1 døgn inden udbrud	5 døgn efter udbrud	Når barnet er rask og der ikke er pasningsproblemer	
Forkølelæssår (Herpes)	2 – 12 dage	Dannelse af blærer	Blærene er tørret ind	Ingen begrænsninger	Hyppigt smitte fra raske smitte-bærere
Fåresyge	2 – 3 uger	5 dage efter at barnet er smittet, eller 7 dage inden symptomerne er begyndt	Indtil kirtelhævelserne er på retur	Når barnet er rask og kirtelhævelserne er på retur	
Hand, foot and mouth disease	3 – 8 dage	Udbrud af sygdommen	Udbrud er på retur	Når barnet er rask	
Hepatitis A (smitsom leverbetændelse)	2 – 6 uger	Sidste del af inkubationstiden	Få dager efter sygdomsudbrud	Når barnet er rask	Smitte fra børn uden symptomer forekommer
Hepatitis B (serum hepatitis)	1 – 6 mdr.	Undersøg	Undersøg	Når barnet er rask	
Influenza	1 – 5 dage	1 døgn inden udbrud	Barnet er rask	Når barnet er rask	
Kighoste	7 – 10 dage	7 – 10 dage efter barnet er smittet, eller fra forkølelæssymptomerne er begyndt	6 uger efter de typiske hoste-anfald er begyndt	Når hosteanfald ikke giver anledning til pasningsproblemer	Særlige regler for uvacinerede børn under 1 år
Kysesyge (mononucleose)	4 – 6 uger	Udbrud af sygdommen	Barnet er rask	Når barnet er rask	Kun lidt smitsomt, smitter fra raske smittebærere
Lus	2 – 8 uger	Smittetidspunkt	Behandling iværksat	Når behandling er iværksat	
Lussingsyge (parvovirus-infektion, erythemå infectiosum)	1 – 2 uger	Få dage før udslættets udbrud	Udslættet er brudt ud	Når barnet er rask	
Maveinfektion med diarre	Oftest et par dage	Diaréens udbrud	Afføringen er normaliseret	Når barnet er rask og afføringen er normal	Smitte fra raske smittebærere forekommer
Mellemørebetændelse med øreflåd	Komplikation til luftvejsinfektion	Kun i sjældnere tilfælde indeholder flåddet bakterier der kan smitte andre		Afhænger af eventuel smitterisiko og pasningsproblemer	
Meningkok sygdom (smitsom meningitis)	2 – 8 dage	Kort før sygdomsudbrud	Behandling iværksat	Når behandlingen er afsluttet og barnet er rask	Hyppigst smitte fra raske smittebærere
Mæslinger	8 – 11 dage	7 dage efter barnet er smittet eller fra forkølelæssymptomerne er begyndt	Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt	Når barnet er rask	
Røde hunde	2 – 3 uger	1 uge efter barnet er smittet eller 14 dage før udslættets udbrud	Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt	Når barnet er rask	
Skarlagensfeber og bakteriel halsbetændelse	1 – 3 døgn	Barnet er smittet	Der er givet penicillin i 2 dage	Efter 2 dages penicillin behandling, såfremt barnet er rask	Smitte fra raske smittebærere forekommer
Skoldkopper	2 – 3 uger	7 dage efter udsættelse eller 3 døgn før	5 dage efter udslættets frembrud,	Når barnet er rask og smittefrit	

		udslættets frembrud	eller indtil der ikke er fremkommet nye blærer i 2 dage og blærene er tørret ind		
Skovflåt overført borreliainfektion	3 – 30 dage	Kun smitte ved bid af skovflåt		Når barnet er rask	Ikke smitte mellem mennesker
Svampeinfektioner	Uger	Udbrud af udslæt	Behandling iværksat	Ingen begrænsninger	Kun lidt smitsomt, smitter fra raske smittebærere
Tredjedagsudslæt (exantheasubitum)	1 – 2 uger	Ukendt	Ukendt	Når barnet er rask	
Vandvorter (mollusca)	1 uge – 6 mdr.	Udbrud	Behandling iværksat	Ingen begrænsninger	
Vorter	2 – 3 mdr.	Udbrud	Behandling iværksat	Ingen begrænsninger. Fodvorter tilrådes dog tildækket eller behandlet lokalt	Hyppigt smitte fra raske smittebærere
Øjenbetændelse	1 – 3 døgn	Øjenbetændelse kan i nogle tilfælde smitte i perioden med pusflåd		Når der kun er lidt pusflåd, og barnet er rask uden pasningsproblemer (undersøg)	Undersøg